

Surgical Dressing

Alveolar analgesic and antiseptic dressing for dental use

Composition

Guaïacol 12.2%, Benzocaïne 8.2%, Menthol 5%, Chlorobutanol 5.1%, Thymol iodide 4.1%, Methyl Salicylate 1.8%, excipient ad 100%

Propriétés

Surgical Dressing is a paste of creamy consistency to be used for treating post-operative dental pains and to combat alveolar infection. The dressing provides almost instant pain relief. Its action is long-lasting as the paste is completely absorbed by the tissues.

Indications

- Post-operative pain following tooth extraction and all other dento-surgical operations
- Relief of pain in gingival tissues and during the treatment of periodontal packets
- Dry, exposed or denuded alveolar sockets
- Lacerated or traumatized tissues as well as similar wounds where dental pain and infections are to be feared

Directions for use

- Apply the necessary quantity of paste to the area requiring treatment
- Where necessary, the application can be repeated during 7 days

Precautions

Avoid using Surgical Dressing for patients who present allergic reactions to Benzocaïne or try any other component. In case of contact with the skin wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice/attention. In case of contact with the eye rinse cautiously with soft, clean water for 15 minutes, holding the eyelids open, and call a doctor immediately. In case of swallowing rinse the mouth with water and consult a doctor. Keep the person exposed at rest, do not force vomiting.

Storage

Store at room temperature, between 5° and 30°C, protected from direct light and humidity.

Shelf life 5 years.

Packaging

Tube of 25g



11630

For dental professional use. Made in Switzerland.

Surgical Dressing

Pâte alvéolaire analgésique et antiseptique à usage dentaire

Composition

Salicylate de méthyle 1.75%, aminobenzoate d'éthyle (benzocaïne) 8.15%, menthol 5%, iodure de thymol 4.1%, gaïacol 12.2%, chlorobutanol hémihydraté 5.1%, excipient ad 100%

Propriétés

Surgical Dressing est une pâte de consistance crémeuse pour le traitement des douleurs postopératoires après extraction dentaire. Elle est particulièrement indiquée dans la prévention de l'infection alvéolaire. L'utilisation de la pâte assure au patient une diminution, puis une disparition rapide de la douleur. La pâte est absorbée entièrement par les tissus et déploie ses effets durant plusieurs heures.

Indications

- Prévention des douleurs post-opératoires après extraction ou lors d'opérations de chirurgie dentaire
- Anesthésie locale des tissus gingivaux et durant le traitement des poches parodontales
- Traitement de l'alvéolite sèche et d'alvéoles dénudées ou exposées
- Traitement des tissus buccaux lacérés ou traumatisés et de blessures gingivales où l'on peut craindre une douleur ou une infection

Mode d'emploi

- Appliquer la quantité nécessaire de pâte sur la zone de traitement
- Si nécessaire l'application peut être répétée durant 7 jours.

Mise en garde

Ne pas utiliser le médicament chez les patients qui sont allergiques à la benzocaïne, ou d'autres composants de la préparation. En cas de contact avec la peau rincer abondamment avec de l'eau et du savon. Si une irritation de la peau apparaît, consulter un médecin. En cas de contact avec l'œil rincer précautionneusement avec de l'eau douce et propre pendant 15 minutes

en tenant la paupière ouverte, et appeler un médecin immédiatement. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin. Garder la personne exposée au repos, ne pas forcer à vomir.

Stokage

Conserver à une température entre 5° et 30°C à l'abri de la lumière directe et de l'humidité.

Durée de conservation 5 ans.

Présentation

Tube de 25g



11630

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse

Surgical Dressing

Антисептическая и местноанальгезирующая повязка для стоматологического применения.

Состав

Гваякол 12,2%, бензокаин 8,2%, хлорбутанола гемигидрат 5,1%, ментол 5%, тимола иодид 4,1%, метилсалицилат 1,8%, вспомогательные вещества до 100%.

Описание

Surgical dressing — гелеобразная масса для снижения болезненности и антисептической обработки слизистой оболочки полости рта после операционных вмешательств. Нанесение препарата способствует практически моментальному устранению болезненных ощущений. Эффект сохраняется до полного растворения препарата.

Показания

- Боли в области лунок удаленных зубов и операционных вмешательств в полости рта
- Обезболивание как во время, так и после пародонтальных вмешательств
- Сухие лунки удаленных зубов
- Болезненные, инфицированные повреждения слизистой оболочки полости рта

Способ применения

Нанести необходимое количество препарата на поврежденную слизистую оболочку. При необходимости повторять аппликации в течение 7 дней.

Меры предосторожности

Не применять препарат у пациентов, страдающих аллергией на этиламинобензоат (бензокаин) или другие компоненты препарата. В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу. В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промыть мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу. В случае проглатывания промыть рот водой и обратиться к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту. В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C, в сухом, защищенном от прямого света месте.

Срок хранения 5 года.

Упаковка

туба 25 г



11630

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey · Switzerland

www.pdsa.ch
© PD 140210